

ESTUDO ANALÍTICO DAS PACIENTES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nara Macedo Botelho BRITO, Gisele Freire FONSECA, Marcella Coelho MESQUITA, Rodolfo Costa LOBATO, Thaís Rodrigues da Cunha FISCHER

RESUMO

Introdução: o câncer de colo do útero corresponde acerca de 15% de todos os tipos de câncer em mulheres, sendo, atualmente, o segundo câncer mais comum no mundo dentre o sexo feminino, excluindo-se o câncer de pele não melanoma.¹

Objetivo: verificar o perfil epidemiológico das pacientes do Programa de Prevenção de Câncer do Colo do Útero (PPCCU) na Unidade Materno-Infantil da UBS Marco.

Método: entrevistadas 100 mulheres que participam do Programa de Prevenção do Câncer do Colo de Útero (PPCCU) na Unidade Materno-Infantil da UBS Marco. Foram incluídas na amostra, de forma aleatória, 100 pacientes do sexo feminino que já tenham iniciado vida sexual, portadoras dos resultados dos exames de colpocitologia oncótica, nesta mesma Unidade em Belém do Pará, período de outubro a novembro de 2007. A pesquisa realizada com a coleta de dados de uma entrevista padronizada com as referidas pacientes que se enquadraram no perfil da pesquisa. Posteriormente, estes dados foram submetidos à análise estatística comparativa de acordo com a natureza das variáveis.

Resultados: observou-se que 30,30% das mulheres tinham de 31 a 39 anos; que 69,69% possuíam renda inferior a R\$499,00; 49,49% eram pardas; 40,40% nunca usaram contraceptivos hormonais e preservativos; 86,87% não eram tabagistas; 60,60% tiveram sua primeira relação sexual antes dos 17 anos; 29,29% já tiveram duas gestações; 19,19% das pacientes já realizaram pelo menos três vezes o exame Papanicolau e 92,93% apresentaram no resultado de seu exame inflamação.

Conclusão: o perfil epidemiológico das pacientes submetidas ao Programa de Prevenção de Câncer do Colo do Útero (PPCCU) na Unidade Materno-Infantil da UBS Marco é de mulheres com idade entre 31 a 39 anos; com renda variando de R\$200,00 a R\$499,00 reais; pardas; procedentes de Belém; que nunca usaram contraceptivo hormonal; com parceiros que nunca usam preservativo; não tabagistas; apresentando idade da primeira relação sexual antes dos 17 anos; já tiveram duas gestações; já realizaram no mínimo três exames Papanicolau; possuem epitélio inflamatório e apresentam algum tipo de DST's.

DESCRITORES: câncer de colo do útero, perfil, mulheres

Universidade do Estado do Pará
Centro de Saúde Escola do Marco

Trabalho apresentado à VII Jornada de Trabalhos Científicos do Curso de Medicina, em 23 de janeiro de 2008.

Recebido em 22.10.2008- Aprovado em 27.11.2009