

Imagens em NEUROLOGIA

Bocejo Histérico

Histerical Yawning

Péricles Maranhão-Filho¹

O termo histeria foi eliminado do Mental Disorders Diagnostic Manual of the American Psychiatric Association em 1952, sendo substituído por conversão. Expressão criada por Paul Bjerre, em 1920, e que designa a conversão de uma tensão emocional inconsciente em uma doença física.

Segundo Paul Briquet, dentre os fatores predisponentes das crises conversivas destacam-se: ser jovem, do sexo feminino, temperamento afetivo, historia familiar, baixo nível sócio econômico, ser imigrante, sexualmente licencioso e com saúde debilitada².

A conversão possui quadro clínico proteiforme. Dentre as formas de apresentação mais frequentes destacamos: paralisias, alterações sensitivas e sensoriais, convulsões, e movimentos involuntários. Nesta grande coleção de manifestações conversivas, lembramos um tipo raro de crise, embora já conhecido de longa data: o bocejo (Figura1).

Existem inúmeras teorias que tentam explicar a etiopatogenia tanto da manifestação conversiva quanto o bocejo em si, mas até hoje nenhuma delas foi definitivamente consubstanciada².




Figura1. Bocejo histérico (Bâillements Hysterique). Retirado da Iconographie de La Salpêtrière (1890).¹

Referências

1. La Tourette G, Guinon H. Bâillements Hysterique. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière; 1890; Plate XVIII: 110.
2. Okun M S. Integrating Histeria in to the Neurological Examination. Syllabi-On-CD-Rom. AAN. 53rd Annual Meeting. Philadelphia, May 2001.

¹Professor Adjunto de Neurologia HUCFF - UFRJ. Neurologista do INCA - HCl RJ.

Correspondência: Dr. Péricles Maranhão-Filho. Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 1680 / 1802. Rio de Janeiro, RJ. 22620-311 e-mail: pmaranhaofilho@gmail.com