

Screening para aneurisma de aorta abdominal: evidências insuficientes para ser feito em mulheres

Autores da tradução:

Pablo Gonzáles Blasco¹, Marcelo Rozenfeld Levites^{II}, Pedro Subtil de Paula^{II}

Sociedade Brasileira de Medicina de Família

QUESTÃO CLÍNICA

Quem deve passar por *screening* (rastreamento) para verificar aneurisma de aorta abdominal e quando?

RESUMO

O Serviço de Prevenção dos Estados Unidos (United States Preventive Services Task Force, USPSTF) continua a recomendar o *screening* uma vez para todos os homens de 65 a 75 anos que fumam ou já fumaram, e talvez para os homens dessa idade que nunca fumaram. Em uma mudança da *guideline* (diretriz) de 2005, o USPSTF refere evidência insuficiente para recomendar *screening* em mulheres que fumam. Eles continuam a não recomendar o *screening* para mulheres que nunca fumaram.¹

Nível de evidência = opinião de especialista.²

DESENHO DO ESTUDO

Guideline prático.

CASUÍSTICA

Variada.

DISCUSSÃO

Esta *guideline* é uma atualização da *guideline* realizada pelo USPTF em 2005. Eles continuam a recomendar o ultrassom em homens de 65 a 75 anos que já fumaram. Nesse grupo, o *screening* reduz em média 1,4 mortes por 1.000 homens que fizeram o *screening*. Dada a baixa prevalência de aneurisma de aorta abdominal em homens que nunca fumaram, o grupo recomenda oferecer este *screening* para um grupo individualizado de pacientes. Em uma mudança de recomendação, não existe nenhuma recomendação para realizar *screening* em mulheres fumantes ou ex-fumantes. Em mulheres que nunca fumaram, a recomendação é contra a realização.

¹Médico de família, doutor em Medicina, diretor científico e membro-fundador da Sociedade Brasileira de Medicina de Família (Sobramfa).

^{II}Médico de família e diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família (Sobramfa).

Editores responsáveis por esta seção:

Pablo Gonzáles Blasco. Médico de família, doutor em Medicina, diretor científico e membro-fundador da Sociedade Brasileira de Medicina de Família (Sobramfa).

Marcelo Rozenfeld Levites. Médico de família e diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família (Sobramfa).

Pedro Subtil de Paula. Médico de família e diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família (Sobramfa).

Tradução e adaptação:

Sobramfa (Sociedade Brasileira de Medicina de Família)

Rua Sílvia, 56 — Bela Vista — São Paulo (SP) — CEP 01331-000

Tel. (11) 3253-7251/3285-3126

E-mail: sobramfa@sobramfa.com.br — <http://www.sobramfa.com.br>

Entrada: 5 de fevereiro de 2015 — Última modificação: 5 de fevereiro de 2015 — Aceite: 5 de fevereiro de 2015

REFERÊNCIAS

1. LeFevre ML; U.S. Preventive Services Task Force. Screening for abdominal aortic aneurysm: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. *Ann Intern Med.* 2014;161(4):281-90.
2. Essential Evidence Plus. Levels of Evidence. Disponível em: http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=oxford. Acessado em 2015 (24 fev).

RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO DESTA SEÇÃO: SOBRAMFA

